


Karte 7: Blei (Pb) im Oberboden (0 - 10 cm bzw. 0 - 20 cm) unter Berücksichtigung der Karbonatbeeinflussung

Perzentil in mg kg ⁻¹		50 %	85 %	90 %	95 %	97,5 %
Wald 0 - 10 cm	karbonatbeeinflusst n = 175	n = 88 74	n = 62 150	n = 8 174	n = 9 222	n = 4 248
	karbonatfrei n = 328	n = 166 37	n = 115 67	n = 17 75	n = 14 99	n = 8 154
Grünland 0 - 10 cm	karbonatbeeinflusst n = 448	n = 227 38	n = 154 73	n = 23 102	n = 24 150	n = 9 190
	karbonatfrei n = 797	n = 410 29	n = 288 59	n = 40 69	n = 40 87	n = 20 109
Acker 0 - 20 cm	karbonatbeeinflusst n = 530	n = 276 17	n = 179 29	n = 23 35	n = 26 50	n = 13 64
	karbonatfrei n = 623	n = 335 18	n = 201 25	n = 28 27	n = 30 31	n = 13 37

keine Information:
 Grünland n = 57
 Acker n = 1



Quelle: Daten der Bodenzustandsinventur der Bundesländer und der Waldbodenzustandsinventur des BFW aus BORIS
 GIS-Bearbeitung: Ingrid Roder, Oktober 2008